



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS MÉDICAS
GRADUAÇÃO EM MEDICINA**

**ÉERICA TAMIRES GOMES DE ARAÚJO
ITIEL DE SOUZA AQUINO
RANDOLFO RANDALL FARIAS FERREIRA BRITO
ROSANE SILVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

**EFEITO DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
SOBRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR:
REVISÃO SISTEMÁTICA**

**CAMPINA GRANDE – PB
JULHO – 2014**

**ÉRICA TAMIRES GOMES DE ARAÚJO
ITIEL DE SOUZA AQUINO
RANDOLFO RANDALL FARIAS FERREIRA BRITO
ROSANE SILVA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

**EFEITO DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
SOBRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR:
REVISÃO SISTEMÁTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de médico(a) no Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Campina Grande.

Orientador: Prof. Me. Erik Trovão Diniz

**CAMPINA GRANDE – PB
JULHO – 2014**

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Setorial do CCBS - UFCG

A663e

Araújo, Érica Tamires Gomes de.

Efeito da avaliação nutricional sobre o tempo de internação hospitalar: revisão sistemática/ Érica Tamires Gomes de Araújo, Itiel de Souza Aquino, Randolpho Randall Farias Ferreira Brito, Rosane Silva de Oliveira Teixeira. -- 2014.

37 f. il.

Monografia (Graduação em Medicina) – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

Referências.

Orientador: Prof. Erik Trovão Diniz, Ms.

1. Avaliação nutricional. 2. Tempo de Internação. 3. Prognóstico. 4. Desnutrição. 5. Risco nutricional. I. Autor. II. Título.

CDU 615.874.2: 616 -001.16

Dedicamos este trabalho às nossas famílias que tanto se angustiaram e nos deram forças para seguir em frente e acreditar que mesmo diante de tantos revezes tudo vale a pena, desde que feito com amor e afinho.

Aos nossos amigos que, imbuídos de energia e sem perder o bom humor, foram compreensíveis e nos apoiaram em momentos de inquietude.

Ao nosso orientador, Dr. Erik Trovão Diniz, pela total atenção e majestosa paciência em nos conduzir.

Enfim, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram na construção deste estudo.

AGRADECIMENTOS

A Deus pela inspiração e força para lutar pelos nossos sonhos.

Aos nossos pais pelo apoio incondicional e atemporal.

Aos nossos amigos pela compreensão e sensibilidade em relação à tensão e responsabilidade deste trabalho.

Ao nosso ilustre mestre, professor Erik Trovão Diniz, pela paciente, dedicada, competente e amigável orientação, que nos permitiu trabalhar com confiança sempre.

RESUMO

Introdução. A desnutrição em pacientes internados correlaciona-se com o aumento da frequência de intercorrências clínicas e mortalidade, além de estar associada a um maior período de hospitalização, maior risco de infecções e aumento dos custos para o serviço de saúde. **Objetivos.** a) Elaborar revisão sistemática sobre o efeito da avaliação nutricional sobre o tempo de internação hospitalar; b) Caracterizar a prevalência de desnutrição e risco nutricional nos pacientes hospitalizados. **Metodologia.** Revisão Sistemática de artigos originais utilizando os descritores “*Nutrition Assessment*”, “*Length of stay*” e “*Prognosis*”, no período de janeiro de 2004 a janeiro 2014, nas bases de dados da Bireme/BVS, publicados em Inglês, Português ou Espanhol. **Resultados.** De um total de 2.181 pacientes analisados nos estudos selecionados, cerca de 57% tinham idade igual ou maior a 60 anos, com média variando entre 63 e 85 anos. A prevalência de desnutrição ou de risco nutricional da população geral estudada variou entre 0,98% a 69,9%, a depender do instrumento de avaliação nutricional utilizado na análise. Em relação ao tempo de internação hospitalar e sua associação com o grau de desnutrição ou risco nutricional, evidenciou-se correlação positiva na maioria das séries. **Conclusão.** A elevada prevalência da desnutrição à admissão hospitalar parece acarretar em maior tempo de internação dos pacientes, elevação de custos hospitalares e pior do desfecho clínico. Apesar de não existir um modelo de avaliação nutricional adequado, sua importância é indiscutível e estudos futuros são necessários para elucidar melhor o tema.

Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Tempo de Internação. Prognóstico. Desnutrição. Risco Nutricional.

ABSTRACT

Introduction. Malnutrition in hospitalized patients correlates with increased frequency of clinical complications and mortality, as well as being associated with prolonged hospitalization, increased risk of infections and increased costs to the health service. **Objectives.** a) Develop a systematic review on the effect of nutritional status on length of hospital stay; b) Characterize the prevalence of malnutrition and nutritional risk in hospitalized patients. **Methodology.** Systematic Review of original articles using the keywords "Nutrition Assessment", "Length of stay" and "Prognosis", from January 2004 to January 2014 in the databases Bireme/BVS, published in English, Portuguese or Spanish. **Results.** From a total of 2,181 patients analyzed in the selected studies, about 57% were aged 60 years or more, averaging between 63 and 85 years. The prevalence of malnutrition or nutritional risk of the general population studied ranged from 0.98% to 69.9%, depending on the nutritional assessment tool used in the analysis. Regarding time hospitalization and its association with the degree of malnutrition or nutritional risk, a positive correlation was shown in most series. **Conclusion.** The high prevalence of malnutrition at admission seems to result in longer hospital patients, increased hospital costs and worse clinical outcomes. Although a model of appropriate nutritional assessment does not exist, its importance is indisputable and further studies are needed to further elucidate the subject.

Keywords: Nutrition Assessment. Length of stay. Prognosis. Malnutrition. Nutritional Risk.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1. Fluxograma de seleção dos artigos.	17
TABELA 1. Classificação dos artigos conforme a qualidade do estudo.	19
TABELA 2. Frequência dos artigos segundo o país de origem do estudo.	20
TABELA 3. Classificação dos artigos conforme o tipo de estudo.	20
TABELA 4. Frequência dos artigos de acordo com o periódico de publicação.	21
TABELA 5. Frequência dos pacientes conforme a faixa etária.	22
TABELA 6. Média de idade dos pacientes.	22
TABELA 7. Frequência dos pacientes em função do gênero.	22
TABELA 8. Prevalência de Desnutrição e/ou Risco Nutricional dos pacientes estudados, de acordo com o instrumento de avaliação nutricional aplicado.	23
TABELA 9. Instrumentos de Avaliação Nutricional utilizados nos estudos selecionados.	23
TABELA 10. Comparação do tempo de internação hospitalar entre os grupos de pacientes considerados bem nutridos e os que se apresentavam desnutridos ou em risco de desnutrição.	24
TABELA 11. Comparação entre as variáveis utilizadas pelos instrumentos de avaliação nutricional.	28

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADA American Dietetic Association

ANSG Avaliação Nutricional Subjetiva Global

BIREME Biblioteca Regional de Medicina

BVS Biblioteca Virtual em Saúde

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

DP Desvio Padrão

GNRI Geriatric Nutritional Risk Index

LILACS Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde

IC Intervalo de Confiança

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

MNA Mini Nutritional Assessment

MUST Malnutrition Universal Screening Tool'

NRI Nutritional Risk Index

NRS 2002 Nutritional Risk Screening 2002

PG-SGA Patient-Generated Subjective Global Assessment

SCAD Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos

SCIELO Scientific Electronic Library Online

SGA Subjective Global Assessment

UFCG Universidade Federal de Campina Grande

SUMÁRIO

1	Introdução	10
2	Objetivos	12
2.1	Objetivo principal	12
2.2	Objetivos secundários	12
3	Metodologia	13
3.1	Desenho do estudo	13
3.2	Objeto do estudo	13
3.3	Recuperação de artigos	13
3.4	Critérios de inclusão	13
3.5	Critérios de exclusão	13
3.6	Critérios de sistematização secundária	14
3.7	Estratégia para pesquisa nos bancos de dados	14
3.8	Etapas da seleção dos artigos	14
3.9	Estratégia para síntese das informações	15
3.10	Estratégia para elaboração descritiva das informações	15
3.11	Qualidade dos estudos	15
3.12	Planejamento estatístico	16
3.13	A busca dos artigos	16
4	Resultados	17
4.1	A inclusão de estudos	17
4.2	A qualidade dos estudos	19
4.3	A origem dos estudos	19
4.4	O tipo dos estudos	20
4.5	O periódico de publicação	20
4.6	Quantidade de pacientes envolvidos nos estudos	21
4.7	A idade e o gênero dos pacientes nos estudos analisados	21
4.8	Avaliação nutricional dos pacientes estudados	22
4.9	Instrumentos de avaliação nutricional	23
4.10	Associação desnutrição e tempo de internação hospitalar	24
5	Discussão	25
6	Conclusão	32

7 Referências Bibliográficas	33
8 Apêndices e Anexos	35
8.1 Apêndice A – Ficha de Sistematização de Dados	35

1 INTRODUÇÃO

A análise dos aspectos nutricionais dos pacientes hospitalizados revela que estes apresentam necessidades alimentares especiais, determinadas, principalmente, pelos desequilíbrios metabólicos encerrados pela doença. Vários estudos, no Brasil e no mundo, já demonstraram que a desnutrição possui elevada prevalência entre os pacientes hospitalizados (LEITE, CARVALHO E SANTANA & MENESES, 2005; DE CÁSSIA AQUINO E PHILIPPIII, 2012).

A desnutrição em pacientes internados correlaciona-se com o aumento da frequência de intercorrências clínicas e mortalidade, além de também ser associada a um maior período de internamento hospitalar, maior risco de infecções e impacto negativo nos custos para o serviço de saúde. Sabe-se que a desnutrição em indivíduos hospitalizados decorre de uma gama de condições, prévias e posteriores à hospitalização, podendo ser atribuída à doença e/ou à terapia instituída (AQUINO & PHILIPPI, 2011; CAMPELO EC et al., 2007).

A etiologia da desnutrição hospitalar é complexa. A doença subjacente pela qual o paciente é hospitalizado é um fator importante na apresentação de desnutrição, mas é errado considerar que a desnutrição é inerente à doença e, como tal, não tratável. Isto tem sido demonstrado em vários estudos de intervenção nutricional em diferentes patologias nas quais a desnutrição foi parcialmente reversível (ELIA, ZELLIPOUR & STRATTON, 2005).

Apesar de não haver consenso acerca dos critérios diagnósticos de desnutrição, a avaliação do estado nutricional, bem como a identificação dos fatores de risco para desnutrição e a determinação de instrumentos de triagem nutricional são fundamentais para a adequada condução da terapêutica aplicada ao paciente (AQUINO & PHILIPPI, 2011; DE CÁSSIA AQUINO & PHILIPPI, 2012). Em 1994, a ADA (*American Dietetic Association*) definiu como risco nutricional a “presença de fatores que podem acarretar e/ou agravar a desnutrição em pacientes”.

O risco nutricional relaciona-se a vieses imbricados no estado geral do paciente, assim como na história da doença atual, agregando aspectos psicossociais e físicos à análise. Dessa maneira, no intuito de propiciar a terapia nutricional

adequada para cada paciente, a identificação dos fatores de risco, a partir de critérios padronizados, é essencial ao tratamento global do paciente internado, elevando a eficácia da conduta instituída, considerando precocidade e coerência, que se reflete em bem-estar ao doente (MAICÁ & SCHWEIGERT, 2008; AQUINO & PHILIPPI, 2011).

Este componente está fortemente ligado à indicação inadequada de terapias nutricionais, avaliação inconsistente do estado nutricional e acompanhamento deficitário da resposta do paciente ao tratamento implementado (LEITE, CARVALHO E SANTANA & MENESES, 2005).

Dada a complicada rede de fatores relevantes na identificação e monitoração do estado nutricional do paciente hospitalizado, reconhece-se, atualmente, o impacto da formação e atuação de equipes ou comissões multidisciplinares de suporte nutricional, formadas por médicos, enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos, de modo a assegurar atenção adequada ao paciente em tratamento. Além dos agravos à saúde, tais como infecções, traumatismos, cirurgias e restrição hídrica e alimentar, a negligência da equipe assistente ao cuidado nutricional figura entre os elementos que mais comumente contribuem para o estabelecimento de quadros de desnutrição (LEITE, CARVALHO E SANTANA & MENESES, 2005).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal

Elaborar revisão sistemática sobre o efeito da avaliação nutricional sobre o tempo de internação hospitalar.

2.2 Objetivo secundário

a) Caracterizar a prevalência de desnutrição e risco nutricional nos pacientes hospitalizados.

3 METODOLOGIA

3.1 Desenho do estudo

Revisão sistemática sobre estudos originais, com análise secundária de dados.

3.2 Objeto do estudo

Levantamento bibliográfico de artigos sobre avaliação nutricional e seu efeito no tempo de internação hospitalar nos bancos de dados eletrônicos LILACS, MEDLINE, SCIELO, PUBMED e BIBLIOTECA COCHRANE no período de 2004 a 2014.

3.3 Recuperação de artigos

Solicitação via servidor da Biblioteca Central da Universidade Estadual da Paraíba.

3.4 Critérios de inclusão

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:

- a.** Estudos publicados no período de Jan/2004 a Jan/2014;
- b.** Publicações em idioma Inglês, Português e Espanhol;
- c.** Estudos com objetivo principal ou secundário de analisar o efeito da avaliação nutricional em pacientes hospitalizados;
- d.** Estudos com população alvo com idade a partir de 18 anos.

3.5 Critérios de exclusão

Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão:

- a. Publicações na forma de Relatos e Séries de Casos, Teses, Dissertações, Anais de Congresso e *Abstracts*, Respostas ou Comentários de Artigos originais e Artigos de Revisão;
- b. Estudos que utilizaram pacientes cirúrgicos e/ou oncológicos ou gestantes;
- c. Estudos envolvendo modelos animais.

3.6 Critérios de sistematização secundária

A estruturação do banco de dados com os elementos de sistematização para a análise secundária de dados será baseada no modelo preconizado por Figueiredo & Tavares-Neto (2001).

3.7 Estratégia para pesquisa nos bancos de dados

A busca nas bases de dados eletrônicas foi realizada por meio dos descritores relacionados ao objetivo principal: “*Nutrition Assessment*”, “*Length of Stay*”, “*Prognosis*”.

3.8 Etapas da seleção dos artigos

a) Os artigos selecionados pela leitura do título foram avaliados separadamente, pelo pesquisador, segundo os critérios de inclusão, exclusão e duplicidade. Os resumos (*Abstracts*) foram avaliados por três revisores, independentes, segundo os critérios de inclusão e exclusão. As discordâncias foram submetidas à avaliação para inclusão ou exclusão, em consenso pelos revisores.

b) Resgate do artigo completo no Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos - SCAD (BVS/BIREME – <http://scad.bvs.br>) e em revistas disponíveis no Portal da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - www.periódicos.capes.gov.br).

c) Leitura do artigo completo pelos revisores para seleção ou exclusão do artigo; As discordâncias foram submetidas à avaliação para inclusão ou exclusão, em consenso.

3.9 Estratégia para síntese das informações

Após a seleção final dos artigos, todos os trabalhos que satisfizeram os critérios de seleção foram lidos na íntegra em conjunto pelos autores. Foram indexados ao banco de dados as principais informações caracterizadoras de cada trabalho incluído, além de outros dados de relevância para a revisão.

O banco de dados sistematiza tais informações que foram coletadas dos trabalhos (Apêndice A).

3.10 Estratégia para elaboração descritiva das informações

As informações sintetizadas e sistematizadas no banco de dados foram confrontadas, sendo criado um corpo de texto.

3.11 Qualidade dos estudos

Os artigos foram classificados utilizando uma adaptação do modelo idealizado por Figueiredo e colaboradores (FIGUEIREDO & TAVARES-NETO, 2001). A partir da quantidade de variáveis presentes, utilizando a Ficha de Sistematização de Dados (Apêndice A), os artigos foram classificados em:

- Classe A (excelente): 100% das variáveis;
- Classe B (ótima ou boa): de 76 a 99% das variáveis;
- Classe C (regular): de 51 a 75% das variáveis;
- Classe D (ruim): 50% ou menos das variáveis pesquisadas.

3.12 Planejamento estatístico

Após a coleta e seleção qualitativa dos dados dos artigos, os mesmos foram implantados em uma planilha e foi realizada análise descritiva.

3.13 A busca dos artigos

A busca dos artigos teve como ponto de partida dois braços de associação dos descritores. Um deles associou “*Nutrition assessment*” e “*Length of stay*” e o outro buscou artigos que associaram “*Nutrition assessment*” e “*Prognosis*”. Realizou-se a busca nas bases de dados da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) / Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados no período de janeiro de 2004 a janeiro 2014.

Filtrou-se os estudos publicados nos idiomas espanhol, inglês e português, que avaliaram pacientes maiores de 18 anos, de ambos os gêneros. Foram recuperados 621 artigos identificados através do primeiro braço da pesquisa e 640 publicações por meio do segundo.

Aplicando-se como filtros de seleção o período e o idioma de publicação, além de estudos que envolviam apenas seres humanos, foram identificados 341 artigos no primeiro braço de busca e 332 estudos no segundo.


4 RESULTADOS

4.1 A inclusão de estudos

Dos artigos identificados e após avaliação dos revisores, excluindo-se os trabalhos repetidos entre os mesmos e as discordâncias consensuais, a busca dos artigos resultou no número de 137 trabalhos, os quais tiveram os 'Resumos' ou 'Abstracts' avaliados pelos investigadores. Desses 137 artigos, 62 trabalhos foram selecionados para terem seus textos completos estudados.

Dos 62 artigos estudados os textos completos, 10 estudos foram selecionados como adequados aos critérios de inclusão desta revisão (Figura 1), aos quais foi aplicado a Ficha de Sistematização dos Dados (Apêndice A).

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos.



Os artigos selecionados como relevantes para este estudo foram:

Artigo 1- BAUER, J. M. et al. Comparison of the Mini Nutritional Assessment, Subjective Global Assessment, and Nutritional Risk Screening (NRS 2002) for nutritional screening and assessment in geriatric hospital patients. **Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie**, v. 38, n. 5, p. 322-327, 2005. ISSN 0948-6704.

Artigo 2- FELDBLUM, I. et al. Nutritional risk and health care use before and after an acute hospitalization among the elderly. **Nutrition**, v. 25, n. 4, p. 415-420, 2009. ISSN 0899-9007.

Artigo 3- GARIBALLA, S.; FORSTER, S. Malnutrition is an independent predictor of 1-year mortality following acute illness. **British journal of nutrition**, v. 98, n. 02, p. 332-336, 2007. ISSN 1475-2662.

Artigo 4- LÓPEZ-GÓMEZ, J. J. et al. Valoración del riesgo nutricional en pacientes ancianos hospitalizados mediante diferentes herramientas. **Endocrinología y nutrición**, v. 58, n. 3, p. 104-111, 2011. ISSN 1575-0922.

Artigo 5- MARTINEAU, J. et al. Malnutrition determined by the patient-generated subjective global assessment is associated with poor outcomes in acute stroke patients. **Clinical Nutrition**, v. 24, n. 6, p. 1073-1077, 2005. ISSN 0261-5614.

Artigo 6- RASLAN, M. et al. Complementarity of Subjective Global Assessment (SGA) and Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) for predicting poor clinical outcomes in hospitalized patients. **Clinical Nutrition**, v. 30, n. 1, p. 49-53, Feb 2011. ISSN 0261-5614. Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000287902200008 >.

Artigo 7- RIQUELME, R. et al. Neumonía adquirida en la comunidad en el anciano hospitalizado: Aspectos clínicos y nutricionales. **Revista médica de Chile**, v. 136, n. 5, p. 587-593, 2008. ISSN 0034-9887.

Artigo 8- SANCHEZ-MUNOZ, L. A. et al. Mini nutritional assessment (MNA) as nutrition screening tool in internal medicine. Advantages and disadvantages. **Revista Clinica Espanola**, v. 210, n. 9, p. 429-437, Oct 2010. ISSN 0014-2565. Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000283268800001 > .

Artigo 9- STRATTON, R. J. et al. 'Malnutrition Universal Screening Tool' predicts mortality and length of hospital stay in acutely ill elderly. **British journal of nutrition**, v. 95, n. 02, p. 325-330, 2006. ISSN 1475-2662.

Artigo 10- THOMAS, J.; ISENRING, E.; KELLETT, E. Nutritional status and length of stay in patients admitted to an Acute Assessment Unit. **Journal of human nutrition and dietetics**, v. 20, n. 4, p. 320-328, 2007. ISSN 1365-277X.

4.2 A qualidade dos estudos

Dos artigos selecionados foram analisadas as variáveis sistematizadas, conforme os critérios estabelecidos por Figueiredo e Neto (FIGUEIREDO & TAVARES-NETO, 2001). A consolidação dessa análise esta representada na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos artigos conforme a qualidade do estudo.

QUALIDADE DA DESCRIÇÃO	n	%
Classe A (Excelente)	00	00
Classe B (Ótima ou Boa)	09	90
Classe C (Regular)	01	10
Classe D (Ruim)	00	00
TOTAL	10	100

LEGENDA: n – número de artigos.

4.3 A origem dos estudos

A origem dos estudos selecionados mostrou-se bastante variada, rendendo artigos de vários lugares do globo. A Tabela 2 sintetiza essa diversidade.

Tabela 2. Frequência dos artigos segundo o local de origem do estudo.

LOCAL DO ESTUDO	n	%
Alemanha	1	10
Austrália	2	20
Brasil	1	10
Chile	1	10
Israel	1	10
México	2	20
Reino Unido	2	20
TOTAL	10	100

LEGENDA: n – número de artigos.

4.4 O tipo de estudo

Sob o aspecto metodológico do tipo de estudo, a maioria dos artigos selecionados aborda o assunto de maneira prospectiva. Comparativamente, a Tabela 3 apresenta os estudos analisados.

Tabela 3. Classificação dos artigos conforme o tipo de estudo.

ESTUDO	TIPO DE ESTUDO
(Feldblum <i>et al.</i> , 2009)	Prospectivo
(Riquelme <i>et al.</i> , 2008)	Prospectivo
(Martineau <i>et al.</i> , 2005)	Retrospectivo
(Raslan <i>et al.</i> , 2011)	Prospectivo
(López-Gómez <i>et al.</i> , 2011)	Retrospectivo
(Sanchez-Munoz <i>et al.</i> , 2010)	Prospectivo
(Thomas, Isenring e Kellett, 2007)	Prospectivo
(Stratton <i>et al.</i> , 2006)	Prospectivo
(Bauer <i>et al.</i> , 2005)	Prospectivo
(Gariballa e Forster, 2007)	Prospectivo

4.5 O periódico de publicação

Houve grande diversidade no resgate dos artigos em função do período no qual foi publicado. A Tabela 4 apresenta bem essa variedade.

Tabela 4. Frequência dos artigos de acordo com o periódico de publicação.

PERIÓDICO	n
<i>British Journal of Nutrition</i>	02
<i>Clinical Nutrition</i>	02
<i>Zeitschrift Fur Gerontologie Geriatrie</i>	01
<i>Revista médica de Chile</i>	01
<i>Nutrition™</i>	01
<i>Endocrinología y Nutrición</i>	01
<i>Journal of Human Nutrition and Dietetics</i>	01
<i>Revista Clínica Española</i>	01
TOTAL	10

LEGENDA: n – número de artigos.

4.6 Quantidade de pacientes envolvidos nos estudos

Tomando-se o total de pacientes envolvidos nos estudos selecionados, a população acompanhada somou 2.181 pacientes, todos com idade superior a 18 anos.

4.7 A idade e o gênero dos pacientes nos estudos analisados

Considerando a faixa etária dos pacientes estudados, alguns relatos não especificaram intervalos de idade da população acompanhada. Isto é, registrou-se apenas que o grupo estudado apresentava mais de 18 anos. Outros, entretanto, especificaram grupos etários, cuja consolidação da análise de tais estudos permitiu o enquadramento nos seguimentos apresentados abaixo (Tabela 5). A média de idade dos pacientes estudados esta representado na Tabela 6. O Artigo 6, selecionado para esta revisão, não mencionou dados sobre a idade dos pacientes estudados.

A proporção de pacientes em função do gênero, assim como a idade, não foi especificada em alguns estudos, tendo sido diferenciada em outros (Tabela 7).

Tabela 5. Frequência dos pacientes conforme a faixa etária.

IDADE	N	%
≥18 anos. Sem intervalo especificado.	842	38,6
18 – 59 anos	91	4,2
≥60 anos	1.248	57,2
TOTAL	2.181	100

LEGENDA: N – número de pacientes.

Tabela 6. Média de idade dos pacientes.

ARTIGO	MÉDIA DE IDADE (anos)	DP
Artigo 1	80,2	± 7,7
Artigo 2	73,8	± 5,6
Artigo 3	76	± 6,0
Artigo 4	80,86	± 4,2
Artigo 5	72	± 12,9
Artigo 6	*	
Artigo 7	63	± 19
Artigo 8	81	± 7,0
Artigo 9	85	± 5,5
Artigo 10	79,9	± 11,0

LEGENDA: DP – Desvio padrão

Tabela 7. Frequência dos pacientes em função do gênero.

GÊNERO	N	%
Sem especificação	1.188	54,5
Masculino	511	23,4
Feminino	482	22,1
TOTAL	2.181	100

LEGENDA: N – número de pacientes.

4.8 Avaliação nutricional dos pacientes estudados

Em função da prevalência de Desnutrição e/ou do Risco Nutricional dos pacientes acompanhados, distinção feita conforme o instrumento de avaliação nutricional aplicado em cada estudo, a Tabela 8 evidencia o resultado da avaliação nutricional realizada em cada trabalho.

Tabela 8. Prevalência de Desnutrição e/ou Risco Nutricional dos pacientes estudados, de acordo com o instrumento de avaliação nutricional aplicado.

ESTUDO	EM RISCO NUTRICIONAL	DESNUTRIDOS
(Feldblum <i>et al.</i> , 2009)	37,72%	0,98%
(Riquelme <i>et al.</i> , 2008)	-	69,9%
(Martineau <i>et al.</i> , 2005)	-	19,2%
(Raslan <i>et al.</i> , 2011)	27,9%	38,9%
(López-Gómez <i>et al.</i> , 2011)	{ NRI 96,3% GNRI 81,3%	-
(Sanchez-Munoz <i>et al.</i> , 2010)	36,8%	4,7%
(Thomas, Isenring e Kellett, 2007)	-	53%
(Stratton <i>et al.</i> , 2006)	58%	-
(Bauer <i>et al.</i> , 2005)	{ MNA 37,5%; NRS2002 63,8%	{ MNA 32,5% SGA 45%
(Gariballa e Forster, 2007)	-	-

LEGENDA: GNRI – Geriatric Nutritional Risk Index; NRI – Nutritional Risk Index; NRS 2002 – Nutritional Risk Screening 2002; MNA – Mini Nutritional Assessment; SGA – Subjective Global Assessment.

4.9 Instrumentos de avaliação nutricional

Entre os estudos selecionados, houve importante diversidade entre os instrumentos de avaliação nutricional aplicados. A Tabela 9 evidencia essa distinção especificando a ferramenta utilizada em cada um dos estudos analisados.

Tabela 9. Instrumentos de Avaliação Nutricional utilizados nos estudos selecionados.

AUTOR	INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL									
	MUST	MNA	SGA	PG-SGA	NRS 2002	NRI	GNRI	Bioquímicas*	Antropometria	
(Martineau <i>et al.</i> , 2005)				X				X		
(Bauer <i>et al.</i> , 2005)		X	X		X			X		
(Stratton <i>et al.</i> , 2006)	X									
(Gariballa e Forster, 2007)								X	X	
(Thomas, Isenring e Kellett, 2007)			X					X		
(Riquelme <i>et al.</i> , 2008)								X	X	
(Feldblum <i>et al.</i> , 2009)		X				X		X		
(Sanchez-Munoz <i>et al.</i> , 2010)		X						X		
(Raslan <i>et al.</i> , 2011)			X		X					
(López-Gómez <i>et al.</i> , 2011)						X	X	X		

LEGENDA: GNRI – Geriatric Nutritional Risk Index; NRI – Nutritional Risk Index; NRS 2002 – Nutritional Risk Screening 2002; MNA – Mini Nutritional Assessment; MUST – Malnutrition Universal Screening Tool; PG-SGA – Patient-Generated Subjective Global Assessment; SGA – Subjective Global Assessment; *Albumina, Pré-albumina, Ferritina e Contagem leucocitária.

4.10 Associação desnutrição e tempo de internação hospitalar

A associação entre o estado ou o risco nutricional e tempo de internação hospitalar foi estudada comparando pacientes bem nutridos com os grupos em risco de desnutrição ou desnutridos. Tais dados, conforme os estudos selecionados são evidenciados na Tabela 10.

Tabela 10. Comparação do tempo de internação hospitalar entre os grupos de pacientes considerados bem nutridos e os que se apresentavam desnutridos ou em risco de desnutrição.

ESTUDO	BEM NUTRIDOS	MAL NUTRIDOS	RISCO NUTRICIONAL	P
(Feldblum <i>et al.</i> , 2009)	5 dias (\pm 0,4)	-	7,14 dias (\pm 0,8)	0,01
(Riquelme <i>et al.</i> , 2008)	11 dias (\pm 6)	13,7 dias (\pm 10,5)	-	0,024
(Martineau <i>et al.</i> , 2005)	8 dias (2-33)	13 dias (4-55)	-	<0,001
(Raslan <i>et al.</i> , 2011)		Não específica		
(López-Gómez <i>et al.</i> , 2011)		Não específica		
(Sanchez-Munoz <i>et al.</i> , 2010)		11,08 dias (\pm 9,79) ¹		-
(Thomas, Isenring e Kellett, 2007)	4 dias (2-19)	5 dias (1-24)	-	0,323
(Stratton <i>et al.</i> , 2006)	15 dias (11-19)	-	Médio risco: 24 dias (16-32) Alto risco: 28 dias (21-35)	0,02
(Bauer <i>et al.</i> , 2005)	3,9 dias (\pm 7,8)	Moderado 5,4 dias (\pm 8,2) Severo 10,8 dias (\pm 26,3)	-	<0,001
(Gariballa e Forster, 2007)		Não específica		

LEGENDA: p – Probabilidade de significância; ¹ – Média de tempo de internação de todos os pacientes do referido estudo, sem distinguir grupo em relação ao estado ou risco nutricional.

5 DISCUSSÃO

O diagnóstico nutricional, mediante critérios fidedignos e de relevância reconhecida pela ciência médica, representa um passo importante para a terapêutica intra-hospitalar, bem como se mostra eficiente para abreviar o período de internação, resultando em melhora clínica significativa dos pacientes assistidos. Dessa forma, estabelecer esse tipo de propedêutica e abordagem, de modo sistemático e uniforme num dado serviço de referência em assistência à saúde, definindo o perfil nutricional do indivíduo que se hospitaliza, pode contribuir grandemente para a efetividade do atendimento proposto, bem como se refletir em bem-estar do paciente.

Em estudo prospectivo de coorte, que incluiu 818 pacientes triados através da SGA, evidenciou que cerca de 29% dos pacientes admitidos no serviço estavam desnutridos, apresentaram maior tempo de internação hospitalar e eram mais propensos a serem readmitidos após 15 dias da alta. Além disso, o mesmo estudo mostrou ainda que a desnutrição foi um preditor significativo de mortalidade e a assistência prestada a tais pacientes requerido maior demanda de recursos financeiros da instituição de saúde (LIM *et al.*, 2012).

Assim, a desnutrição propriamente dita pode, em suma, ser predisposta por múltiplos fatores, incluindo ingestão inadequada de alimentos previamente à internação hospitalar, comorbidades crônicas, idade, uso de medicamentos, depressão e distúrbios da função cognitiva. Tendo em vista esses elementos, a identificação precoce do estado e de fatores de risco nutricionais do paciente admitido no serviço de saúde, pode permitir melhores resultados clínicos, aumentando a eficácia dos esforços terapêuticos e profiláticos em relação à condição nutricional e geral do paciente (FELDBLUM *et al.*, 2009).

Um outro estudo, este observacional, transversal e multicêntrico, mostrou uma prevalência de desnutridos nos seus pacientes assistidos em torno de 23%, tendo a desnutrição sido associada ao aumento no tempo de internação hospitalar e a maiores custos na assistência prestada (ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ *et al.*, 2012).

De acordo com dados do Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI), realizado com 4000 pacientes adultos hospitalizados, há uma elevada prevalência de desnutrição nos hospitais brasileiros (48,1% de desnutrição na população estudada) (RASLAN *et al.*, 2011). O Estudo Latino Americano de Nutrição (ELAN) aplicado em hospitais gerais de treze países da América Latina, com uma amostra de 9348 pacientes adultos, corroborou com tais evidências, identificando 50,2% de desnutrição (CRESTANI *et al.*, 2011).

Já no estudo epidemiológico, transversal, de Rezende *et al.*, que avaliou o estado nutricional de 244 doentes internados em uma instituição filantrópica em Salvador (Bahia), revelou que mais da metade (63,11%) dos pacientes hospitalizados encontram-se desnutridos (REZENDE *et al.*, 2010).

Esta revisão identificou nos estudos avaliados uma prevalência de desnutrição à admissão hospitalar que variou entre 0,98% e 69,9% (Tabela 8) (RIQUELME *et al.*, 2008; FELDBLUM *et al.*, 2009). No entanto, apesar do extenso intervalo de variação mencionado, observa-se que este índice permanece de acordo com o que foi evidenciado em estudos anteriores. Essa ampla variação pode ser explicada pela diversidade de ferramentas para avaliação nutricional, como também em virtude do perfil socioeconômico do paciente estudado (KYLE, GENTON & PICHARD, 2005).

Ainda considerando a elevada prevalência da desnutrição à admissão hospitalar, esta revisão comprovou o interesse pelo estudo do tema ao redor do mundo, uma vez que os trabalhos publicados foram realizados em diversos países. Os dez artigos selecionados apresentam sete nacionalidades diferentes, tendo a Austrália, o México e o Reino Unido figurado com dois artigos cada um (Tabela 2).

Com relação a idade dos pacientes, esta revisão incluiu estudos que envolveram indivíduos com mais de 18 anos. Observou-se que a maioria deles (57,2%) possuía idade igual ou superior a 60 anos e 38,6% da população estudada não teve enquadramento em intervalo etário (Tabela 5). No entanto, a análise descritiva dos estudos selecionados nesta revisão mostra que média de idade variou de 63 a 85 anos (Tabela 6). Ou seja, dentre as faixas etárias categorizada, a

população idosa (idade ≥ 60 anos) merece cuidado em relação ao estado nutricional, pois além da significância quantitativa de pacientes em estado de desnutrição ou de risco nutricional, este grupo apresenta maiores flutuações metabólicas e de composição corporal, estando, portanto, mais sensíveis à desnutrição, aumentando o risco de desfechos clínicos desfavoráveis, o tempo de internação hospitalar e a mortalidade geral (LÓPEZ-GÓMEZ *et al.*, 2011).

Sob o aspecto de gênero, o Artigo 2 evidenciou um número maior de homens no grupo de pacientes bem nutridos, com significância estatística ($p=0,02$) (FELDBLUM *et al.*, 2009). Em contrapartida, o Artigo 9 apresentou dados mostrando que não houve diferença significativa entre os gêneros em relação ao risco de desnutrição (STRATTON *et al.*, 2006).

Os estudos desta revisão utilizaram diversos instrumentos para a avaliação nutricional. No total foram sete modelos diferentes (MUST, MNA, SGA, PG-SGA, NRS 2002, NRI e GNRI), além de variáveis antropométricas e bioquímicas (Tabela 9). Apenas dois dos dez estudos não utilizaram dados bioquímicos na avaliação nutricional. Os modelos mais utilizados foram o MNA e o SGA.

A variedade de ferramentas que podem ser usadas para determinar o estado nutricional do paciente aumenta a possibilidade de discrepâncias entre resultados das avaliações, já que os mais variados critérios ou variáveis podem ser utilizados (antropometria, bioquímica, exame físico, avaliação subjetiva) (KYLE, GENTON & PICHARD, 2005). A comparação entre tais variáveis conforme o instrumento de avaliação nutricional utilizado em cada estudo selecionado nesta revisão encontra-se evidenciado na Tabela 11.

Os métodos podem avaliar o grau de desnutrição ou o risco de desnutrição (NRI) no ambiente hospitalar. Algumas ferramentas não dão alternativas quando certas variáveis não podem ser avaliadas, como peso e altura em idosos e/ou acamados. O MUST, por exemplo, contorna essa dificuldade (STRATTON *et al.*, 2006).

Além do MNA e do GNRI, que proporciona uma avaliação direcionada à população idosa, o MUST também apresenta vantagens para esse grupo, pois oferece alternativas em sua avaliação no que diz respeito a medidas antropométricas (peso, altura e IMC). O MUST foi desenvolvido para avaliar todos os adultos e pode ser usado mesmo quando não é possível a medida da altura e do peso, o que não ocorre nos outros instrumentos de avaliação nutricional (STRATTON *et al.*, 2006).

TABELA 11. Comparação entre as variáveis utilizadas pelos instrumentos de avaliação nutricional.

VARIÁVEL	MUST	NRS-2002	MNA	SGA	PG-SGA	NRI	GNRI
IMC	X	X	X	X			
Perda de peso	X	X	X		X	X	X
Efeito de doença aguda	X	X	X	X	X		
Diminuição da ingestão alimentar		X	X	X	X		
Sintomas gastrointestinais				X	X		
Capacidade funcional				X	X		
Idade > 70 anos		X					
Albumina Sérica						X	X
Mobilidade			X				
Problemas neurofisiológicos			X				
Exame físico				X	X		

LEGENDA: GNRI – Geriatric Nutritional Risk Index; NRI – Nutritional Risk Index; NRS 2002 – Nutritional Risk Screening 2002; MNA – Mini Nutritional Assessment; MUST – Malnutrition Universal Screening Tool; PG-SGA – Patient-Generated Subjective Global Assessment; SGA – Subjective Global Assessment.

Dentre os parâmetros bioquímicos, a quantificação da Albumina sérica pode ser útil quando analisada cuidadosamente. A hipoalbuminemia pode estar relacionada a estados de desnutrição, principalmente crônicos, devido sua meia-vida

longa (20 dias). Relatos indicam que o nível de albumina sérica é um bom preditor de tempo de internação hospitalar; a redução do seu nível à admissão está associada a um aumento no tempo de hospitalização, sendo também um preditor de morbi-mortalidade (JW *et al.*).

Entretanto, o Artigo 1 selecionado nesta revisão, foi o único a demonstrar correlação estatisticamente significativa entre o nível de albumina sérica e o tempo de internação da população estudada, tendo como método de avaliação nutricional o MNA (BAUER *et al.*, 2005). Os Artigos 5 e 10 desta seleção, em contrapartida, não evidenciaram correlação significativa entre níveis reduzidos de albumina no soro e o aumento do tempo de hospitalização (MARTINEAU *et al.*, 2005; THOMAS, ISENRING & KELLETT, 2007).

O Artigo 2 segue nessa mesma linha evidenciando que não houve diferença nos níveis séricos de albumina entre os grupos; no entanto, os valores de colesterol sérico e hemoglobina foram significativamente menores no grupo de risco nutricional (FELDBLUM *et al.*, 2009). Um dado deveras relevante acerca da eficiência da albumina sérica em prever quaisquer desfechos clínicos é que ela sofre influência de fatores não nutricionais como sepse, trauma, inflamação ou doença hepática, constituindo-se como um marcador impreciso quando tomado isoladamente (MARTINEAU *et al.*, 2005).

Assim sendo, em circunstâncias de descompensação aguda da condição de base, as respostas neuroendócrinas e metabólicas induzem a reorientação da síntese protéica priorizando as proteínas de fase aguda em detrimento da síntese de albumina, esclarecendo parcialmente a imprecisão da dosagem sérica dessa substância como marcador de avaliação nutricional (GARIBALLA & FORSTER, 2007).

Além da albumina sérica, outro marcador laboratorial que pode ser utilizado para avaliação nutricional é a contagem total de linfócitos, cujo valor pode ser útil na mensuração do risco de complicações infecciosas em idosos, mas não é considerado bom método de avaliação nutricional (JW *et al.*).

Analisando a associação entre desnutrição e tempo de internação hospitalar, a primeira progride à medida que aumenta o período de estadia na unidade de saúde: 46% dos pacientes já estão desnutridos nos primeiros cinco dias. Esse número cresce para 68% entre cinco e quinze dias e aumenta para 83% nos doentes internados há mais de quinze dias (REZENDE *et al.*, 2010).

Dos dez estudos selecionados nesta revisão, seis avaliaram a variação no tempo de internação e sua relação com o grau de nutrição do paciente assistido. Observou-se que houve um aumento no tempo de permanência hospitalar dos que foram classificados como desnutridos ou com risco aumentado de desnutrição. A estadia hospitalar aumentou proporcionalmente ao grau de desnutrição dos pacientes internados. No entanto, conforme o Artigo 10, os pesquisadores não encontraram associação estatisticamente significativa entre a desnutrição e o aumento do tempo de internação ($p=0,323$), como salientado na Tabela 10.

Um estudo prospectivo britânico publicado por Stratton em 2006, que envolveu 150 pacientes, evidenciou que o tempo de internação hospitalar foi progressivamente maior conforme o risco nutricional do paciente: os de baixo risco permaneceram cerca de 15 dias (IC=95%), os de médio risco, 24 dias (IC=95%) e os de alto risco contabilizaram 28 dias de hospitalização (IC=95%) (STRATTON *et al.*, 2006). Bauer e colaboradores, num estudo prospectivo, publicado em 2005, que estudou 121 pacientes, apenas o MNA mostrou associação significativa (Teste de Kruskal-Wallis, $p=0,044$) entre o tempo de internação hospitalar e a avaliação nutricional realizada. Associação semelhante não pode ser estabelecida ao se considerar o SGA ($p=0,130$) ou o NRS 2002 ($p=0,377$) (BAUER *et al.*, 2005).

Estudos acenam que a assistência ao paciente desnutrido ou em risco nutricional pode resultar em custos gerais elevados à unidade de saúde, apesar de nenhum dos artigos selecionados nesta revisão, referenciar valores a esse respeito. Assim sendo, otimizar o cuidado frente a tais grupos populacionais, através de métodos sistemáticos e de simples aplicação, pode resultar em qualidade da assistência médica.

A avaliação nutricional é de fundamental importância não somente para uma adequada terapia nutricional, mas também serve como parâmetro para prever desfechos clínicos.

A prevalência de desnutrição mostra-se elevada nos pacientes hospitalizados. Entretanto, de modo geral, existe um desconhecimento por parte da equipe de saúde com relação ao estado nutricional dos pacientes assistidos, influenciando de forma significativa e independente o tempo de permanência hospitalar, predispondo agravos e desfechos clínicos desfavoráveis. Estudos aludem que a assistência a esse perfil de paciente pode resultar em custos gerais elevados à unidade de saúde, apesar de nenhum dos artigos selecionados nesta revisão, referenciar valores a esse respeito.

Ferramentas de avaliação nutricional utilizam diversas variáveis clínicas e as evidências mostram que não existe um modelo ideal de avaliação nutricional no ambiente hospitalar. Logo, o instrumento a ser utilizado deverá ser baseado no perfil dos pacientes, na experiência dos profissionais e no tipo de instituição de saúde. No entanto, independente do modelo adotado, a avaliação nutricional deverá sempre ser realizada e, notadamente, o mais precocemente possível.

6 CONCLUSÃO

Conclui-se a partir desta revisão que pacientes com alto risco nutricional e/ou desnutrição no momento da hospitalização apresentam maior tempo de internação, evidenciando, portanto, a importância da avaliação nutricional à admissão hospitalar. No entanto, novos estudos são eminentemente necessários para avaliar e buscar um método prático e eficaz em determinar de forma precisa o estado nutricional de pacientes hospitalizados. Essa providência deverá contribuir para elucidar de modo mais claro a relação entre a desnutrição ou o risco nutricional e o tempo de internação hospitalar, melhorando o nível de assistência da equipe de saúde.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AQUINO, R. D. C. D.; PHILIPPI, S. T. Identification of malnutrition risk factors in hospitalized patients. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 57, n. 6, p. 637-643, 2011. ISSN 0104-4230.
- BAUER, J. M. et al. Comparison of the Mini Nutritional Assessment, Subjective Global Assessment, and Nutritional Risk Screening (NRS 2002) for nutritional screening and assessment in geriatric hospital patients. **Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie**, v. 38, n. 5, p. 322-327, 2005. ISSN 0948-6704.
- CAMPELO, E.C.; VASCONCELOS R.C.; CABRAL M.A. Terapia Nutricional. Em: *Conduitas em Clínica Médica*. Filgueira NA et al. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007. p. 759-771.
- CRESTANI, N. et al. Perfil nutricional de pacientes adultos e idosos admitidos em um hospital universitário. **Ciência & Saúde**, v. 4, n. 2, p. 45-49, 2011. ISSN 1983-652X.
- DE CÁSSIA AQUINO, R.; PHILIPPI, S. T. Desenvolvimento e avaliação de instrumentos de triagem nutricional. **clínica**, v. 6, p. 7, 2012.
- ELIA, M.; ZELLIPOUR, L.; STRATTON, R. To screen or not to screen for adult malnutrition? **Clinical Nutrition**, v. 24, n. 6, p. 867-884, 2005. ISSN 0261-5614.
- FELDBLUM, I. et al. Nutritional risk and health care use before and after an acute hospitalization among the elderly. **Nutrition**, v. 25, n. 4, p. 415-420, 2009. ISSN 0899-9007.
- FIGUEIREDO, G. C.; TAVARES-NETO, J. Estruturação de um banco de dados para análise secundária de informações em relatos ou série de casos. **Rev Bras Ortop**, v. 36, n. 11-12, p. 407-411, 2001.
- GARIBALLA, S.; FORSTER, S. Malnutrition is an independent predictor of 1-year mortality following acute illness. **British journal of nutrition**, v. 98, n. 02, p. 332-336, 2007. ISSN 1475-2662.
- JW, P.-B. M. et al. Triagem e Avaliação do Estado Nutricional.
- KYLE, U. G.; GENTON, L.; PICHARD, C. Hospital length of stay and nutritional status. **Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care**, v. 8, n. 4, p. 397-402, 2005. ISSN 1363-1950.
- LEITE, H. P.; CARVALHO, W. B. D.; SANTANA E MENESES, J. F. Atuação da equipe multidisciplinar na terapia nutricional de pacientes sob cuidados intensivos. **Rev. nutr**, v. 18, n. 6, p. 777-784, 2005. ISSN 1415-5273.

LIM, S. L. et al. Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortality. **Clinical Nutrition**, v. 31, n. 3, p. 345-350, Jun 2012. ISSN 0261-5614. Disponível em: <<Go to ISI>://WOS:000305368400006 >.

LÓPEZ-GÓMEZ, J. J. et al. Valoración del riesgo nutricional en pacientes ancianos hospitalizados mediante diferentes herramientas. **Endocrinología y nutrición**, v. 58, n. 3, p. 104-111, 2011. ISSN 1575-0922.

MAICÁ, A. O.; SCHWEIGERT, I. D. Avaliação nutricional em pacientes graves. **Rev Bras Ter Intensiva**, v. 20, n. 3, p. 286-95, 2008.

MARTINEAU, J. et al. Malnutrition determined by the patient-generated subjective global assessment is associated with poor outcomes in acute stroke patients. **Clinical Nutrition**, v. 24, n. 6, p. 1073-1077, 2005. ISSN 0261-5614.

RASLAN, M. et al. Complementarity of Subjective Global Assessment (SGA) and Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) for predicting poor clinical outcomes in hospitalized patients. **Clinical Nutrition**, v. 30, n. 1, p. 49-53, Feb 2011. ISSN 0261-5614. Disponível em: <<Go to ISI>://WOS:000287902200008 >.

REZENDE, I. F. B. et al. Prevalência da desnutrição hospitalar em pacientes internados em um hospital filantrópico em Salvador (BA), Brasil. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 3, n. 2, 2010. ISSN 2236-5222.

RIQUELME, R. et al. Neumonía adquirida en la comunidad en el anciano hospitalizado: Aspectos clínicos y nutricionales. **Revista médica de Chile**, v. 136, n. 5, p. 587-593, 2008. ISSN 0034-9887.

SANCHEZ-MUNOZ, L. A. et al. Mini nutritional assessment (MNA) as nutrition screening tool in internal medicine. Advantages and disadvantages. **Revista Clinica Espanola**, v. 210, n. 9, p. 429-437, Oct 2010. ISSN 0014-2565. Disponível em: <<Go to ISI>://WOS:000283268800001 >.

STRATTON, R. J. et al. 'Malnutrition Universal Screening Tool' predicts mortality and length of hospital stay in acutely ill elderly. **British journal of nutrition**, v. 95, n. 02, p. 325-330, 2006. ISSN 1475-2662.

THOMAS, J.; ISENRING, E.; KELLETT, E. Nutritional status and length of stay in patients admitted to an Acute Assessment Unit. **Journal of human nutrition and dietetics**, v. 20, n. 4, p. 320-328, 2007. ISSN 1365-277X.

ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ, J. et al. Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients; the PREDyCES Study. **Nutrición hospitalaria**, v. 27, n. 4, 2012. ISSN 0212-1611.

8 APÊNDICES

8.1 APÊNDICE A – Ficha de Sistematização de Dados

**EFEITO DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE O TEMPO DE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR: REVISÃO SISTEMÁTICA
FICHA DE SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS
VARIÁVEIS SISTEMATIZADAS**

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO DO ESTUDO:
AUTOR PRINCIPAL:
ANO DE PUBLICAÇÃO:
IDIOMA:
PERIÓDICO:
LOCAL DO ESTUDO:
TIPO DE ESTUDO:
OBJETIVO:

II - DADOS DE SISTEMATIZAÇÃO		
	Variável	Valor / Resposta
1	Quantidade de pacientes	
2	Idade (anos)	
3	Gênero	
4	Avaliação Nutricional	
5	Instrumento de Avaliação Nutricional aplicado	
6	Peso (kg)	
7	Altura (m)	
8	IMC (kg/m ²)	
9	Albumina	
10	Tempo de internação hospitalar	
11	Custo da assistência ao paciente	